

|         |                  |
|---------|------------------|
| 対象疾患    | 大腸がん             |
| レジメン名   | FOLFIRI+ラムシルマブ療法 |
| 1コースの日数 | 14日              |
| 催吐性リスク  | 中等度              |

レジメン内容

| No | 薬品名                | 投与量                           | 投与方法 | 投与ルート | 投与時間                     | 投与日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----|--------------------|-------------------------------|------|-------|--------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|    |                    |                               |      |       |                          | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1  | 生理食塩液              | 100mL                         | 点滴静注 | メイン   | ルートキープ<br>フラッシュ用         | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2  | グラニセトロン<br>デキサメタゾン | 3mg/100mL<br>6.6mg            | 点滴静注 | メイン   | 30分                      | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3  | 生理食塩液<br>ラムシルマブ    | 250mL<br>8mg/kg               | 点滴静注 | メイン   | 初回60分<br>2回目以降30分        | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 4  | 生理食塩液<br>イリノテカン    | 250mL<br>150mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | メイン   | 90分<br>レボホリナートと同時に開始     | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 5  | 5%ブドウ糖液<br>レボホリナート | 250mL<br>200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 側管    | 120分<br>イリノテカンと同時に開始     | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6  | 生理食塩液<br>5-FU      | 50mL<br>400mg/m <sup>2</sup>  | 急速静注 | メイン   | 全開で投与                    | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 7  | 生理食塩液<br>5-FU      | 適量<br>2400mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | メイン   | 46時間<br>インフューザーポンプを用いて投与 | ○   | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |