

対象疾患	大腸がん
レジメン名	IRI+セツキシマブ(毎週)療法
1コースの日数	14日
催吐性リスク	中等度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日																							
						1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	...	29	...	36	...	43	...	49			
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○				○				○				○		○		○		○		○			
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分	○								○						○									
2	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分					○								○				○		○		○			
	デキサメタゾン	6.6mg																											
3	ジフェンヒドラミン	50mg	経口	内服	制吐剤投与と同時に内服	○				○				○				○		○		○		○		○			
4	生理食塩液	初回500mL 2回目以降250m L	点滴静注	メイン	初回120分 2回目以降60分 投与終了後60分経過観 察	○				○				○				○		○		○		○		○			
	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²																											
5	生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分	○								○						○									
	イリノテカン	150mg/m2																											