

対象疾患

大腸がん

レジメン名

IRIS+セツキシマブ(毎週)療法

1コースの日数

14日

催吐性リスク

中等度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日																							
						1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	...	29	...	36	...	42	43	...	49		
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○				○				○				○		○		○			○				
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分	○								○						○									
2	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分					○								○				○			○				
3	ジフェンヒドラミン	50mg	経口	内服	制吐剤投与と同時に内服	○				○				○				○		○		○			○				
4	生理食塩液 セツキシマブ	初回500mL 2回目以降250m L 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	メイン	初回120分 2回目以降60分 投与終了後60分経過観察	○				○				○				○		○		○			○				
5	生理食塩液 イリノテカン	500mL 150mg/m2	点滴静注	メイン	90分	○								○						○									
6	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	80mg/m2/日	内服	経口	1日2回 Day1～14、Day29～42	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○					