

対象疾患	大腸がん
レジメン名	mFOLFOX6+セツキシマブ(毎週)療法
1コースの日数	14日
催吐性リスク	中等度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○							○						
2	グラニセトロン	3mg/100mL	点滴静注	メイン	30分	○													
	デキサメタゾン	6.6mg																	
2	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分								○						
	デキサメタゾン	6.6mg																	
3	ジフェンヒドラミン	50mg	経口	内服	制吐剤投与と同時に内服	○							○						
4	生理食塩液	初回500mL	点滴静注	メイン	初回120分 2回目以降60分 投与終了後60分経過観察	○							○						
		2回目以降250ml																	
	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²																	
5	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	120分 レボホリナートと同時に開始	○													
	オキサリプラチン	85mg/m ²																	
6	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	側管	120分 オキサリプラチンと同時に開始	○													
	レボホリナート	200mg/m ²																	
7	生理食塩液	50mL	急速静注	メイン	全開で投与	○													
	5-FU	400mg/m ²																	
8	生理食塩液	適量	点滴静注	メイン	46時間 インフューザーポンプを用いて投与	○	○	○											
	5-FU	2400mg/m ²																	