

対象疾患	大腸がん
レジメン名	mFOLFOX6+セツキシマブ(隔週)療法
1コースの日数	14日
催吐性リスク	中等度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○													
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分	○													
3	ジフェンヒドラミン	50mg	経口	内服	制吐剤投与と同時に内服	○													
4	生理食塩液 セツキシマブ	250mL 500mg/m ²	点滴静注	メイン	120分	○													
5	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250mL 85mg/m ²	点滴静注	メイン	120分 レボホリナートと同時に開始	○													
6	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	点滴静注	側管	120分 オキサリプラチンと同時に開始	○													
7	生理食塩液 5-FU	50mL 400mg/m ²	急速静注	メイン	全開で投与	○													
8	生理食塩液 5-FU	適量 2400mg/m ²	点滴静注	メイン	46時間 インフューザーポンプを用いて投与	○	○	○											