白岡中央総合病院 化学療法レジメン

対象疾患	胃がん	
レジメン名	SP療法	
1コースの日数	35∃	
催吐性リスク	高度	

レジメン内容

No 薬品名	亚 口 夕	+n ⊢ ≡	+n + + :+	+7. /- ıı I	+\(\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\fra								投与	手目							
	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	•••	21	22	•••	35	
1	テガフール・ギメラシル・ オテラシルカリウム	80mg/m2/日	経口	内服	1日2回Day1~21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	生理食塩液	500mL	··点滴静注	メイン	90分								0								
	硫酸Mg	4mEq											0								
3	アプレピタント	125mg	経口	内服	シスプラチン投与 1時間前に投与								0								
4	生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分								0								
4	硫酸Mg	4mEq											0								
	生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	15分								0								
5	パロノセトロン	0.75mg											0								
	デキサメタゾン	9.9mg											0								
6	フロセミド	20mg	静注	側管									0								
7	生理食塩液	500mL	- 点滴静注	メイン	120分								0								
'	シスプラチン	60mg/m2											0								
8	フロセミド	20mg	静注	側管									0								
9	生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分								0								
10	生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	90分								0								
11	アプレピタント	80mg	経口	内服	朝食後									0	0						