

対象疾患	胃がん
レジメン名	mFOLFOX6+Zolbetuximab療法 CLDN18+
1コースの日数	14日
催吐性リスク	高度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日													
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用		○												
2	パロノセトロン	0.75mg/100mL	点滴静注	メイン	30分		○												
	デキサメタゾン	9.9mg																	
	d-クロルフェニラミン	5mg																	
3	デキサメタゾン	8mg	内服	経口	1日2回 朝食後			○	○	○									
4	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分		○												
	ホスアプレビタント	150mg																	
5	オランザピン	5mg	内服	経口	1日1回就寝前	○	○	○	○	○									
6	生理食塩液	2mg/mLとなるように調整	点滴静注	メイン	2時間以上かけて投与 (体表面積に応じて投与速度を調整)		○												
	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回目以降400mg/m ²																	
7	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	120分 レボホリナートと同時に開始		○												
	オキサリプラチン	85mg/m ²																	
8	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	側管	120分 オキサリプラチンと同時に開始		○												
	レボホリナート	200mg/m ²																	
9	生理食塩液	50mL	急速静注	メイン	全開で投与		○												
	5-FU	400mg/m ²																	
10	生理食塩液	適量	点滴静注	メイン	46時間 インフューザーポンプを用いて投与		○	○	○										
	5-FU	2400mg/m ²																	