

対象疾患 **胃がん**

レジメン名 **mFOLFOX6+Nivolumab療法**

1コースの日数 **14日**

催吐性リスク **中等度**

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○													
2	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○													
	ニボルマブ	240mg/body																	
3	グラニセトロン	3mg/100mL	点滴静注	メイン	30分	○													
	デキサメタゾン	6.6mg																	
4	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	120分 レボホリナートと同時に開始	○													
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>																	
5	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	側管	120分 オキサリプラチンと同時に開始	○													
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>																	
6	生理食塩液	50mL	急速静注	メイン	全開で投与	○													
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>																	
7	生理食塩液	適量	点滴静注	メイン	46時間 インフューザーポンプを用いて投与	○	○	○											
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>																	