白岡中央総合病院　化学療法レジメン

対象疾患	膵臓がん
レジメン名	mFOLFIRINOX療法
1コースの日数	14日
催吐性リスク	高度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日																				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○														○						
2	アプレピタント	125mg	経口	内服	グラニセトロン 投与30分前に服用	○														○						
3	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	点滴静注	メイン	30分	○														○						
4	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250mL 85mg/m^2	点滴静注	メイン	120分	○														○						
5	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250mL 85mg/m^2	点滴静注	側管	120分	○														○						
6	5%ブドウ糖液 イリノテカン	250mL 150mg/m^2	点滴静注	メイン	90分 レボホリナート開始 30分後に開始	○														○						
7	生理食塩液 5-FU	500mL 2400mg/m^2	点滴静注	メイン	46時間	○														○						
8	アプレピタント	80mg	経口	内服			○	○													○	○				

作成日　ver.1　2020年3月27日